

В районе пролива Лаперуза, у восточного побережья Сахалина, Курильских островов и юго-западного побережья Камчатки многочисленны в это время кайры и мелкие чистиковые. В разводьях в северной части моря кайр меньше, но очень многочисленны мелкие чистиковые (по-видимому, конюги). Абсолютное доминирование чистиковых во всех отмеченных районах бесспорно. Значительные скопления они образуют и у Курильских островов, но здесь многочисленны также утки и бакланы.

За исключением глубоководной части моря во всех перечисленных выше районах обычна или многочисленна тихоокеанская чайка. Зимой в Охотском море остаются главным образом половозрелые светлые особи, на долю которых на севере моря приходится около 98%, а у юго-западного побережья Камчатки и Северных Курил — не менее 90%. Другие чайки — полярная, серебристая и белая встречаются на зимовках в Охотском море, но численность их невелика.

В январе—марте, когда льды закрывают всю северную и восточную часть моря, значительная часть птиц, концентрировавшаяся в начале зимы в этих районах, откочевывает через пролив Лаперуза в Японское море, а также в прикурильские воды Тихого океана. Таким образом, в Охотском море, как и в Беринговом, фон зимней орнитофауны составляют ныряющие птицы (чистиковые, утки, бакланы) и крупные чайки (тихоокеанская).