

Семейство сиговых

Чир относят к семейству сиговых из отряда лососеобразных. Чир это очень распространенная рыба в реках Обь и Енисей. Главным образом живет рядом с Полярным кругом и за ним. Чир, или щокур, как его еще называют, имеет мясистое, прогонистое и сжатое с боков тело. Голова у него мелкая, рот нижний.

Рыльная площадка отлично выражена, его верхнечелюстная кость широкая и короткая. Чешуя его крупная, плотная. Окрас спины темный, бока его серебристые с золотым оттенком. У самок и самцов во время нереста на теле, плавниках, голове, появляются эпителиальные бугорки, которые сильнее всего проявляются у самцов.

Период нереста

В период нереста у самок первый луч их нагрудного плавника становится эмалевым, белым, а остальные лучи так и остаются темными. Чир может вырастать до 84 сантиметров и достигать массы тела в 10 килограмм, нообычные размеры не превышают 48-56 сантиметров и масса его обычно не более 2,5-3 килограмм. Чиры живут не более 25 лет, в среднем 20 лет.

В сибирских водах имеется два вида чира – озерно-речная и речная. Представители озерно-речной формы чира большую часть своей жизни проводят в озерах, и только во время размножения выходит в реки. Для нагула используют курьи, заливы, озера, которые связаны с речной системой, совершая значительные перемещения. В пойменные озера, которые располагаются вблизи от рек, для нагула весной могут заходить неполовозрелые представители вида.

При снижении уровня воды в озерах чиры покидают их и возвращаются в реки. В материковые, отдаленные озера, поднимаются более крупные представители вида, которые уже когда-то принимали участие в нересте. Массовый ход половозрелого чира начинается в начале августа. Нерестится он в начале октября. В Енисее чир достигает половой зрелости в 7-8 лет.