



Основные пролетные пути уток и куликов проходят вдоль побережий. Однако в больших количествах они встречаются и вдали от берега. Весьма интенсивный пролет уток, куликов, а также сухопутных птиц наблюдается от северного побережья на юг и юго-запад в направлении Сахалина.

Тонкоклювый, серый и бледноногий буревестники встречаются в Охотском море в течение всей осени. Но уже к сентябрю, в связи с отлетом на юг размножающихся в данном году особей, численность этих видов заметно уменьшается. В результате этого, а также увеличения в открытых водах других птиц, трубконосые с начала осени перестают быть доминирующей группой в мелководных районах.

В глубоководной части моря они по-прежнему преобладают, хотя доля их уменьшается.

Закончив размножение, большая часть видов рассредоточивается в сторону открытого моря, а некоторые сразу начинают откочевку на юг. Естественно, что в связи с этим в сентябре за пределами прибрежной зоны заметно увеличивается количество чаек и чистиковых. У тихоокеанской чайки первыми рассеиваются в море молодые особи.

Так, летом в северной половине моря на долю особей в сером оперении приходится не более 15% из встречаемых в открытом море чаек, а в сентябре их процент увеличивается до 50. В Беринговом море и у восточного побережья Камчатки эта чайка во все сезоны тяготеет к шельфовой зоне. В Охотском море в период осенних кочевок

она широко рассеивается по всему морю.