



В северной части Японского моря у берегов Приморья, Сахалина и Хоккайдо основу населения составляют чистиковые птицы (конюги, кайры и другие), утки (морянка, каменушка — *Histrionicus histrionicus* и другие), тихоокеанская чайка и бакланы. На их долю здесь приходится не менее 90% птиц. В южной и юго-восточной частях моря у берегов Хонсю и юго-восточного побережья полуострова Корея все эти трупы также представлены, но в меньших количествах.

Здесь увеличивается численность относительно теплолюбивых видов, в том числе представителей южно-бореального комплекса. В этих районах над всеми видами преобладают чайки, из которых наиболее многочисленны обыкновенная моевка и чернохвостая чайка.

Преимущественно чайки составляют фон зимнего населения птиц и в открытых глубоководных районах Японского моря. В водах, прилегающих к мелководью и материковому склону, еще могут быть встречены кайры и другие чистиковые, но большая часть глубоководных районов моря особенно пустынна.

Среди чаек в северной части Японского моря преобладают взрослые светлые особи. Так, на их долю у тихоокеанской чайки в водах Приморья и Сахалина приходится в среднем около 90%. При этом в течение зимы доля светлых птиц постепенно увеличивается. В южной части моря доля серых птиц в 2—3 раза выше. Аналогичная картина наблюдается и у чернохвостой чайки.